

※ 변경대비표(바스크롱에프캡슐)

항목	변경 전	변경 후	변경사유
<p>사용상의 주의사항</p>	<p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.</p> <p>1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성</p> <p>2) 만 3개월 미만의 영아</p> <p>3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람</p> <p>4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람</p> <p>5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.</p>	<p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.</p> <p>1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성</p> <p>2) 만 3개월 미만의 영아</p> <p>3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람</p> <p>4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람</p> <p>5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.</p>	<p>표준제조 기준과 부합하게 사용상의 주의사항 변경</p>

<p>2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것. 다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제</p> <p>3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.</p> <p>1) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터해야 한다.</p> <p>2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람</p> <p>3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통,</p>	<p>2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것. 다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제, 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)</p> <p>3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.</p> <p>1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람</p> <p>2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람</p> <p>3) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람</p>	
---	--	--

<p>천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람</p> <p>4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람</p> <p>5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부</p> <p>6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람</p> <p>7) 다음과 같은 기침이 있는 사람</p> <p>흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침</p> <p>8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다</p> <p>4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,</p>	<p>4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부</p> <p>5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람</p> <p>6) 다음과 같은 기침이 있는 사람</p> <p>흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침</p> <p>7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.</p> <p>4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,</p>	
--	---	--

<p>치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부분서를 소지할 것.</p> <p>1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면</p> <p>2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우</p> <p>5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항</p> <p>1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것</p> <p>2) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.</p> <p>3) 복용시에는 음주하지 말 것.</p>	<p>치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부분서를 소지할 것.</p> <p>1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면</p> <p>2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우</p> <p>5. 소아에 대한 투여</p> <p>만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사 의 진료를 받는다.</p> <p>6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항</p> <p>1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것</p> <p>2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용 시킬 것.</p>	
--	--	--

	<p>4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.</p> <p>6. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.</p> <p>2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.</p> <p>3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.</p>	<p>3) 만 7세 이하 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.</p> <p>4) 복용시에는 음주하지 말 것.</p> <p>5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.</p> <p>7. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것</p> <p>2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것</p> <p>3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것</p>	
--	---	---	--